



Arysta LifeScience

P.O.BOX 51 TOKYO 104-6591 JAPAN

アリスタ ライフサイエンス 株式会社 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1(私書箱51号)

2007 年4月11日

お客様各位

アリスタライフサイエンス株式会社
日本事業部

微生物殺菌剤「TMボトキラー®水和剤」の適用拡大のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平素より普及推進にご尽力をいただいております弊社微生物殺菌剤「TMボトキラー®水和剤」の適用拡大に付きまして、取り急ぎご案内申し上げます。

微生物殺菌剤「TMボトキラー®水和剤」は3月20日付けで別紙の通り、なしの黒星病に追加適用拡大になりました(網掛け太字部分)。

今後とも、皆様の多大なるご支援とご協力をお願い申し上げます。

敬具

別紙

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	1000倍	150～300 ℓ/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	うどんこ病						
ぶどう	灰色かび病		200～700 ℓ/10a	開花期～ 幼果期			
かんきつ				発病前～ 発病初期			
なし	黒星病						

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類	灰色かび病	300g/ 10a	6～10 ℓ/10a	発病前～ 発病初期	—	常温 煙霧	—

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バチルスズブチリスを含む農薬の総使用回数
野菜類 シクラメン	灰色かび病	10～15g/10a/日	発病前～ 発病初期	—	ダクト内 投入	—

以上