

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	希釈液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スパーホ カボカブを 含む 農薬の 総使用回数
芝	シバオサゾウムシ幼虫 クマヤカ	2億5000万 頭(約100g) /10a	500～ 2000L/10a	発生初期	—	散布	—
かんしょ(茎葉)	ハスモンヨトウ			老令幼虫発生期		土壌灌注	
	アリモトキゾウムシ イゾゾウムシ			成虫発生初期		散布	
かんしょ	ハスモンヨトウ			老令幼虫発生期		土壌灌注	
野菜類(かんしょ (茎葉)を除く)				果樹類(いちじく を除く)			
いちじく	モモンクイガ	2500万頭 (約10g)	2.5L	産卵期～ 幼虫喰入期	—	主幹及び 主枝の 産卵箇所 に 薬液が滴 るまで 塗布又は 散布	
	キホシカミキリ幼虫						
花き類・ 観葉植物	キンケケチアトゾウムシ	250万頭 (約1g)	7～14L	幼虫発生初期	—	1株当り 300ml 株元灌注	
ヤシ	ヤシオオサゾウムシ	7500万頭 (約30g)	25L	幼虫発生期	—	樹頂部に 散布	